

A large, irregular, textured red ink blot or smudge serves as a background for the title text.


RATA SINUCIDERILOR ANALIZA DATELOR DIGITALE

autori: Angheluta Alexandra, Cîrlig Adelina, Cutitotiu Florentina, Dragoş Emira, Duralia Roxana
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timişoara


IMPORTANȚA ANALIZEI RATEI DE SINUCIDERE



Am analizat date privind sinuciderea incluzând factori demografici, indicatori socio-economici, influențe culturale și date despre sănătatea mintală



Am ales baza de date a Organizației Mondiale a Sănătății (WHO)



Suicide Rates Overview 1985 to 2016
Datele au fost postate pe platforma Kaggle de Rusty, în 2018

O astfel de analiză este importantă pentru:

- înțelegerea și identificarea factorilor care pot contribui la acest fenomen
- dezvoltarea și implementarea unor strategii eficiente de prevenire a sinuciderilor
- identificarea grupurilor de populație cu risc crescut de sinucidere

BENEFICIARI ANALIZEI

Aceștia pot utiliza informațiile pentru a dezvolta strategii mai precise și personalizate în funcție de nevoile specifice ale diferitelor grupuri de populație și regiuni. Prin înțelegerea factorilor de risc și a tendințelor, se pot implementa intervenții mai eficiente, având ca rezultat reducerea sinuciderilor și îmbunătățirea sănătății mintale la nivel global.

Profesioniștii din
domeniul sănătăți
mentale

Guvernul fiecărei
țări implicate în
analiză

Alte entități implicate în
elaborarea politicilor de
prevenire a sinuciderilor

Toți cei care doresc să
înțeleagă fenomenul
sinuciderii

BAZA DE DATE

Este constituită din datele privind numărul de sinucideri din peste 90 de țări din întreaga lume, mai exact: țară, an, sex, grup de vârstă, număr de sinucideri, populație, rata de sinucidere, cheie compozită țară-an, IDU pentru an, gdp_for_year, gdp_per_capita, generație (pe baza mediei grupei de vârstă).



Baza de date este formată din 4 seturi de date, conectate prin timp și spațiu.

DE CE ESTE SUICIDUL O PROBLEMĂ ATÂT DE IMPORTANTĂ?

În fiecare an, peste **700.000 de oameni** își iau viața și sunt mult mai mulți care încearcă să se sinucidă. Nu există date exacte pentru numărul de persoane cu tentative de suicid, însă pe baza unui chestionar din 2021 (National Survey of Drug Use and Mental Health) se aproxima că **0.7%** din adulții locuitori ai Statelor Unite, adică 1.7 milioane de persoane, au avut cel puțin o tentativă de suicid.

În 2019, **1.3%** dintre decese au fost suicidul, făcând ca acesta să fie pe **locul 15** în topul cauzelor de deces din anul respectiv. Sinuciderile se petrec peste tot pe glob, atât în țările cu venituri mari, cât și în cele cu venituri mici sau medii. Studiile arată că, în 2019, **77%** dintre sinuciderile globale au avut loc în **țările cu venituri mici și medii**.



CARE SUNT PERSOANELE CU RISC DE SINUCIDERE?



Conform **American Foundation for Suicide Prevention**, problemele precum depresia, dependența de alcool sau alte substanțe, dizabilitățile fizice sau psihice sau alte tulburări mintale pot fi factori posibili care împing o persoană înspre suicid. Totuși, multe sinucideri se petrec **impulsiv**, în momente de criză sau în momente stresante.



Trecutul joacă și el un rol important atunci când vine vorba de persoane suicidale. Abuzul, traumele din copilărie, bullying-ul sau o tentativă anterioară de suicid sunt puternic asociate cu comportamentul suicidal. Ratele de sinucidere sunt crescute și în rândul grupurilor discriminate, cum ar fi **refugiații și imigranții; persoanele de culoare; persoanele LGBT; persoanele cu dizabilități și prizonierii.**

SUICIDUL: TENDINȚE ȘI CIFRE LA NIVEL GLOBAL

Sinucideri/100k(1985-2015)

13.12 +

1985-2015





ingestia de pesticide,
spânzurarea și armele de foc
sunt printre cele mai
frecvente metode

1 caz de deces la
fiecare



secunde



suicidul în rândul tinerilor
între 15 și 19 ani reprezintă

a 4-a
cauză de deces



subiect taboo, în
unele țări raportările
sunt scăzute sau
inexistente

sursă: Kaggle, WHO

autori: Angheluta Alexandra, Cîrlig Adelina, Cutitotiu Florentina, Dragoș Emira, Duralia Roxana
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara

Suicidul este o problemă gravă de sănătate publică





0800 801 200

SITUAȚIA ÎN ASIA

JAPONIA

Rata sinuciderilor în Japonia a scăzut de la 24,9 în 1986 la 17,4 în 1991, apoi s-a stabilizat la aproximativ 18 până în 1997. În 1997, ratele de sinucidere au crescut brusc, înregistrându-se o creștere de 34,7% doar în 1998 și rămânând relativ ridicate timp de peste un deceniu. După anul 2003, ratele de sinucidere au scăzut treptat, de la cel mai scăzut nivel înregistrat (din 1978)





Ratele de sinucidere și parasuicide au crescut în Singapore din 1985, iar în 1986 au fost estimate la 13,1 la 100.000 și, respectiv, 92 la 100.000. Cei mai predispuși la comportament sinucigaș sunt indienii și cei peste 70 de ani. Săritul de la înălțime este încă cea mai comună metodă de sinucidere, iar auto-otrăvirea este cea mai populară metodă de parasuicidare.

SINGAPORE

SITUAȚIA ÎN ASIA

ISRAEL

Conform Centrului de Medicină Legală din Israel, în intervalul 1985 - 1989, s-a înregistrat o creștere a ratei de sinucideri până în anul 1990 când aceasta a scăzut cu 15%. În anul 1994 s-a înregistrat o altă scădere a ratei de sinucideri de 27% urmată de numărul mare de sinucideri în anul 2014.



În Coreea de Sud, sinuciderea este o problemă de sănătate publică majoră: rata sinuciderilor a crescut constant între 1997 și 2011, de la 13,1 la 31,7 la 100.000. Tendințele au variat în funcție de vârstă și de sex. În 2015, rata sinuciderilor în țară a fost de 28,3 la 100.000, ceea ce o plasează în topul celor mai ridicate rate din lume și din rândul țărilor OCDE


COREEA DE SUD

SITUAȚIA ÎN AUSTRALIA

AUSTRALIA

Numărul de sinucideri din Australia a scăzut în ultimii ani după vârfurile înregistrate în 1997 și 1998. Cu toate acestea, în ciuda acestor scăderi, sinuciderea rămâne o cauză externă majoră de deces.



De exemplu, în fiecare dintre anii din 1994 până în 2004, numărul total de decese prin sinucidere a fost mai mare decât numărul de decese ce implică accidente cu mijloace de transport (48% din toate sinuciderile din 2000 au fost persoane cu vârste cuprinse între 35 și 64 de ani, un alt procent de 13% au fost de 65 de ani și peste).



SITUAȚIA ÎN AMERICA DE NORD

ANTIGUA ȘI BARBUDA

Antigua și Barbuda este una dintre țările cu cea mai mică rată de suicid din lume, aflându-se pe locul 2, după Kuweit, în anul 2017. Unul dintre motivele posibile pentru care rata de suicid este atât de mică în această țară, sunt condițiile de viață oferite de conectarea cu natura, lumina soarelui și un nivel de stres scăzut rezultat din acest stil de viață.





Violența crescută din multe orașe mexicane, războiul drogurilor și numărul mare de crime din țară reprezintă motive posibile de suicid. Între 1990 și 2000, rata de suicid a tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani a crescut cu 74%, acest grup reprezentând 28% din numărul total al sinuciderilor din Mexic.

MEXIC

SITUAȚIA ÎN AMERICA DE NORD


SUA

Suicidul este o problemă majoră de sănătate în Statele Unite ale Americii, fiind **în creștere în toate statele** în afară de Nevada din 1999 până în 2022. Una dintre cele mai importante aspecte care împing lumea înspre suicid sunt **condițiile economice**, în special **șomajul**.



Rata sinuciderilor în Puerto Rico este ridicată, fiind una dintre primele 15 cauze de deces la nivel național. 25% din toate încercările de sinucidere sunt comise de persoane cu boli cronice

PUERTO RICO




În Brazilia au fost înregistrate **183.484 de decese** prin sinucidere între 1996 și 2016, cu o creștere de 69,6% a cazurilor de sinucidere în această perioadă. Principalii **factori de risc** pentru sinucidere sunt bolile și tulburările mintale, utilizarea anumitor medicamente, a drogurilor și a alcoolului și influența mass-media.

BRAZILIA

ARGENTINA

În Argentina, între 1990 și 2015, sinuciderile **au scăzut** la vârstnici, în timp ce **au crescut** la tineri. În 2005, în **cele mai sudice provincii** ale Argentinei, Chubut, Santa Cruz și Tierra del Fuego, ratele de suicid au fost de 5,9 (la femei) și 21,4 (la bărbați) la 100.000, comparativ cu ratele naționale de 3,1 (la femei) și 15,5 (la bărbați).



SITUAȚIA ÎN AMERICA DE SUD

COLUMBIA

Ratele de suicid au început **să crească** din 1998, în special în rândul adulților tineri și al bărbaților cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani și a celor cu vârsta de peste 70 de ani.

Între 2008 și 2009, **ratele de sinucidere în Chile** au fost mai mari decât cele observate înainte și după, crescând mai mult decât în alte țări din America Latină. **Criza economică mondială** poate fi considerată un factor important în spatele acestei creșteri.


CHILE



**SITUAȚIA ÎN
AMERICA DE SUD**


ECUADOR

Suicidul afectează toate grupele de vârstă, dar adolescenții și adulții tineri sunt **cei mai predispuși** să comită acest act. Între 2001 și 2015, 262 de copii sub 12 ani s-au sinucis. În **2015**, pentru prima dată în istorie, **rata sinuciderilor** (8,12 la 100.000) a depășit **rata crimelor** (6,3 la 100.000).



Sinuciderea este **principala cauză a deceselor violente** în Uruguay, depășind atât accidentele rutiere, cât și crimele. Ministrul Sănătății Karina Rando a subliniat paradoxul ratei ridicate de sinucidere a țării, în ciuda faptului că a fost clasată drept **una dintre cele mai fericite țări din lume** de către Națiunile Unite.


URUGUAY



**SITUAȚIA ÎN
AMERICA DE SUD**


Studiu de caz

Lituania



Este remarcabil faptul că Lituania se distinge nu doar prin faptul că este singurul membru al Uniunii Europene prezent în Top 10 al OMS, ci și prin contrastul puternic cu statele baltice vecine, respectiv Letonia și Estonia, în ceea ce privește ratele de suicid.

Lituania locul **7** în clasamentul **global** al țărilor cu cea mai mare rată de suicid, conform estimărilor - OMS 2021.





Lituania

Pe durata întregii perioade, bărbații au menținut rate de suicid semnificativ mai mari decât femeile, iar ambele sexe au înregistrat scăderi, deși bărbații au continuat să prezinte valori mai ridicate. Anii 2006 și 2012 au fost perioade caracterizate de fluctuații notabile în ambele categorii de gen.

Variațiile anuale au fost semnificative în Lituania, atingând minime în 2010 (32,9) și crescând la 36,2 în 2016. În contrast, România a avut variații mai mici, cu rate apropiate între 10,9 și 13,3.

Trebuie menționat că Lituania are o populație mai mică decât România, iar ratele de suicid, chiar dacă mai mari în termeni absoluți, pot reflecta o prevalență mai mare în raport cu populația totală.




Lituania pe generații

Generația Boomers (născuți aproximativ între 1946 și 1964) a început cu o rată de suicid de 61,8 în 1995, atingând un maxim în 1996 (89,0), urmat de o scădere progresivă în anii ce au urmat. Tendințele evidențiază variații notabile, cu minime înregistrate în 2006 (47,8) și 2016 (43,9).



Millennials (născuți aproximativ între mijlocul anilor 1980 și mijlocul anilor 1990) au început cu o rată extrem de mică în 1995 (1,1), cunoscând o creștere semnificativă în 2001 (14,5) și o perioadă de fluctuații, atingând 20,3 în 2016.



Generația X (născuți aproximativ între 1965 și 1980) a avut rate relativ constante între 1995 și 2006, urmate de o scădere semnificativă până la 26,7 în 2006 și fluctuații ulterioare, atingând 40,4 în 2016.



Silent Generation (născuți aproximativ între 1928 și 1945) a avut o rată de suicid de 57,0 în 1995, cu fluctuații ulterioare, atingând minime în 2010 (46,8) și revenind la 56,0 în 2016.

STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA

Un studiu al
Organizației
Mondiale a Sănătății
din 2019 a clasat
România pe locul


109

în topul țărilor cu cea
mai mare rată de
suicid, cu 7,3
sinucideri la 100.000
de locuitori.



În baza de date pe care am analizat-o, am avut date despre suicidul din România în perioada 1989-2016. În această perioadă, numărul de sinucideri din țară a cunoscut o serie de fluctuații de la an la an, fie acestea creșteri ori scăderi, la un nivel relativ mic.


În 2002, au avut loc 3.067 de suiciduri, reprezentând numărul maxim pentru perioada analizată, rata înregistrată fiind de 14,5 suiciduri la 100.000 de locuitori, o rată mai mare decât media globală de 12,2 în anul respectiv.




Comparație pe baza indicelui de dezvoltare umană (HDI)

În 2016, **Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP)** a publicat o listă cu indicele dezvoltării umane pentru toate țările lumii. România s-a clasat pe **locul 50**, cu un indice de **0,802**. Am ales să comparăm România cu o țară cu un indice asemănător (Rusia - 0,804), o țară cu un indice mai mic (Belize - 0,706) și o țară cu un indice mai mare (Norvegia - 0,949).

În **Rusia**, rata de suicid a fost una ridicată pe parcursul tuturor anilor analizați. Creșterile semnificative înregistrate în perioada 1993-1996 pot fi conectate cu căderea URSS, din anul 1991. Nivelul ridicat de stres și schimbările prin care a trecut populația rusă după acest eveniment pot reprezenta motive posibile pentru numărul crescut de decese, care a atins maximum în 1994 (47,3/100.000k). Deși rata de suiciduri se află în scădere din 1999, Rusia rămâne în topul țărilor cu o rată de suicid mare, aflându-se pe locul 11 în 2019, conform OMS.






În **Belize**, rata de suicid a cunoscut multe fluctuații dramatice pe parcursul anilor, cea minimă fiind înregistrată în 1991 (0,43/100k), iar cea maximă, în 1995 (13,73/100k). Între 2014 și 2016, rata tentativelor de sinucidere în rândul adolescenților cu vârsta între 15 și 19 ani a crescut anual cu 39%.

Între 1990 și 1996, rata de suicid din **Norvegia** a fost mai mare decât cea din România, însă în următorii ani acestea au început să fie mult mai similare. Rata maximă în Norvegia a fost înregistrată în 1991 (17,37/100k), iar cea minimă, în 2015 (10,5/100k). Deși este considerată una dintre cele mai fericite țări din lume, aflându-se pe locul 7 în 2023, conform World Happiness Record, în Norvegia sunt înregistrate aproximativ 650 de sinucideri anual.

COMPARAȚIE ÎN FUNCȚIE DE GEN

Între 1999 și 2015, rata de sinucidere din Uniunea Europeană (și Marea Britanie, membru UE la momentul respectiv) a fost de 17,3/100k la bărbați și 5/100k la femei. Între 1999 și 2015, rata de suicid la bărbații români a fost 20,4/100k, adică de **1,17 ori mai mare** decât rata din UE, iar la femeile românce a fost de 3,9/100k, adică de **1,2 ori mai mică** decât rata din UE.



În perioada 1989-2016, în România, rata de suicid a fost de

4,6


ori mai mare la bărbați decât la femei.



COMPARAȚIE ÎNTRE GENERAȚII

Prin analiza numărului de sinucideri în funcție de generație, am observat că **numărul cel mai mare de sinucideri** a fost în rândul persoanelor din **generația Silent** (persoanele născute între 1928 și 1945) și **generația Boomers** (persoanele născute între 1946 și 1964). Aceste generații au înregistrat **rata maximă de suicid în 2002**, cu 23,3 suiciduri/100k la Boomers și 21,7 suiciduri/100k la generația Silent.

Persoanele din **generația X** (născute între 1965 și 1980) au prezentat un număr mai mic de sinucideri până în 2011. De atunci și până în 2016, rata suicidurilor a crescut semnificativ mai mult, fiind mai mult decât dublă în 2013 (17,7/100k) față de 2009 (8,8/100k). **Milenialii** (persoanele născute între 1981 și 1996) au avut cele mai mici rate de suicid în perioada analizată, maximul fiind atins în 2011 (8,7/100k), iar minimul în 1989 (0,5/100k).



SITUAȚIA ÎN , EUROPA


În 2018, unul din nouă adulți (11%) în medie din țările UE a avut simptome de suferință psihologică.

Conform **Eurostat** în 2020, au existat 47252 de decese din cauza autovătămării intenționate în **UE**, ceea ce corespunde la 0,9% din toate decesele raportate în acel an. Acesta este echivalentul unei medii a 10,2 decese la 100 000 de persoane.




ITALIA

În 2019, numărul de sinucideri în **Italia** a fost de 3.759. Până în 2019, din aproape 3,8 mii de sinucideri din țară, 447 dintre persoanele care și-au luat viața sufereau și de depresie, în timp ce 291 aveau alte tulburări mintale. Cele mai multe sinucideri au avut loc în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 35 și 64 de ani.




BELGIA

În 2016, **Belgia** a fost în primele cinci țări europene pentru numărul de victime sinucideri. Numărul deceselor a atins un vârf în 2011, cu 2.084 de victime. Din 2006 până în 2016, mai mult decât dublul numărului de bărbați care s-au sinucis în comparație cu femeile. În Europa, Belgia este una dintre puținele țări în care eutanasia este legală în anumite circumstanțe.




GRECIA

În **Grecia**, au existat rapoarte privind o creștere a deceselor prin sinucidere. În perioada 2014-2015, ratele de sinucidere au fost la un record istoric, dar totuși au rămas cele mai scăzute din toată Europa. **Situația** economică generală este un factor cauzal probabil, precum și creșterea numărului șomerilor.




FRANȚA

În **Franta**, s-a constatat că aproximativ 10.000 de persoane se sinucid în fiecare an, fiind principala cauză de deces în rândul oamenilor cu vârste cuprinse între 15-29 de ani. Pacienții care au încercat să se sinucidă au fost în majoritate femei 564.338 femei (74,8%) și 349.600 bărbați (25,2%).




LUXEMBURG



Un studiu realizat în **Luxemburg** în 2014 arată că 875 de adolescenți au avut în vedere sinuciderea în ultimele 12 luni, ceea ce reprezintă 15,1% dintre adolescenții din studiu. În același an, 811 adolescenți (14,0%) au indicat că au făcut un plan de sinucidere în ultimele 12 luni, iar 448 adolescenți (7,7%) au încercat să se sinucidă (cel puțin o dată) în ultimul an.


MALTA



În medie, 2 decese prin sinucidere pe lună au avut loc în **Malta** în ultimii 11 ani, potrivit statisticilor.


În Malta, vârsta victimelor sinuciderilor cu cea mai răspândită categorie de vârstă este între 40 și 50 de ani. Studiile susține că eforturile ar trebui să se concentreze pe identificarea timpurie a riscurilor și prevenirea lor.

SPANIA



Ratele mortalității prin sinucidere în **Spania** au crescut pe parcursul ultimului secol, atingând un apogeu în anii 1980. În Spania (2016), sinuciderea rămâne principala cauză a morții nenaturale. De asemenea, se observă că mortalitatea crește pe măsură ce vârsta crește la ambele sexe.

MAREA BRITANIE



Riscul de sinucidere în **Anglia și Țara Galilor** este de obicei cel mai mare în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani și cel mai scăzut în rândul persoanelor cu vârsta sub 20 și peste 70 de ani. Datele din 2022 au arătat o creștere a ratelor în rândul celor cu vârsta de 90 și peste.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE ÎN ANALIZA DATELOR

- Lipsa de resurse: În unele țări, autoritățile nu au resursele necesare pentru a colecta și raporta date cu privire la suicid.
- Stigmatizarea: În unele culturi, suicidul este considerat un subiect tabu, ceea ce poate duce la subraportarea cazurilor.
- Motive politice: În unele cazuri, autoritățile pot ascunde datele privind suicidul din motive politice.


Datele disponibile sugerează că rata de suicid la nivel mondial este în scădere, dar există încă o serie de probleme care trebuie abordate. Aceste probleme includ:

- Lipsa de date: Este important să se colecteze date complete și fiabile privind suicidul din toate țările.
- Stigmatizarea: Este necesar să se reducă stigmatul asociat suicidului, astfel încât persoanele care se confruntă cu gânduri suicidale să fie mai înclinate să ceară ajutor.
- Politici de prevenire: Este important să se implementeze politici de prevenire a suicidului, care să vizeze factorii de risc specifici pentru fiecare grup de populație.
- Prin abordarea acestor probleme, putem contribui la reducerea ratei de suicid la nivel mondial și la salvarea de vieți.



RECOMANDĂRI

- Guvernele ar trebui să ofere sprijin financiar pentru colectarea și raportarea datelor privind suicidul.
- Organizațiile internaționale ar trebui să colaboreze cu guvernele pentru a dezvolta standarde comune pentru colectarea și raportarea datelor privind suicidul.
- Personalul medical ar trebui să fie instruit să identifice persoanele care se confruntă cu risc de suicid și să le îndrume către resurse de ajutor.
- Prin implementarea acestor recomandări, putem contribui la asigurarea faptului că persoanele care se confruntă cu gânduri suicidale au acces la informațiile și serviciile de care au nevoie pentru a primi ajutor.



CONCLUZII

Analizarea ratei de suicid este că aceasta poate varia în funcție de vârstă, sex, statut socio-economic și alți factori.

Datele sugerează că rata de suicid la nivel mondial este în scădere, dar există încă o serie de probleme care trebuie abordate, printre care:

- Lipsa de date
- Stigmatizarea:
- Politici de prevenire

Prin abordarea acestor probleme, putem contribui la reducerea ratei de suicid la nivel mondial și la salvarea de vieți.

RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE/ Webografie

- <https://www.kaggle.com/code/lmorgan95/r-suicide-rates-in-depth-stats-insights/input>
- <https://www.annexpublishers.com/articles/JBIA/3301-The-Psychosocial-Analysis-of-a-Suicide-in-Azerbaijan.pdf>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8563048/> <https://www.macrotrends.net/countries/BIH/bosnia/suicide-rate>
- https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/projects-and-operations/cape_verde_-_a_success_story.pdf Analysis-of-a-Suicide-in-Azerbaijan.pdf
- More than 700 000 people die by suicide every year. For each suicide, there are likely more than 20 suicide attempts.
- Suicide: facts and figures globally
- <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341728/9789240026643-eng.pdf?sequence=1>
- <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180716-1>
- <https://www.statista.com/topics/10479/suicide-in-italy/#topicOverview>
- <https://www.statista.com/statistics/519309/suicide-figures-for-belgium/>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719311619>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9265995/>
- <https://www.youth-in-luxembourg.lu/suicidal-behaviour-in-youth-in-luxembourg-findings-from-the-hbsc-2014-luxembourg-study/>
- https://www.maltatoday.com.mt/news/national/118685/malta_had_an_average_of_two_suicide_deaths_per_month_for_the_past_11_years
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173505020300108>
- <https://www.nature.com/articles/s41598-022-12215-3>
- <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7749/>

BIBLIOGRAFIE/ Webografie

- <https://www.camh.ca/en/camh-news-and-stories/camh-study-first-to-examine-contextual-factors-associated-with-higher-rates-of-suicide>
- <https://www.science.org/content/article/geography-loss-global-look-uneven-toll-suicide>
- <https://www.arubatoday.com/does-island-living-prevent-suicide/>
- <https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2000-06-02-0006020165-story.html>
- <https://theconversation.com/rising-suicides-in-mexico-expose-the-mental-health-toll-of-living-with-extreme-chronic-violence-99131>
- http://revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/SM.0185-3325.2023.038/4276#:~:text=In%20Mexico%2C%20various%20authors%20have,et%20al.%2C%202009%29.
- <https://abcnews.go.com/Health/MindMoodNews/story?id=5481482&page=1>
- <https://speakup.us/helpandresources/facts-and-statistics/>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8699163/>
- <https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db241.pdf>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3068880/>
- [https://www.jahonline.org/article/S1054-139X\(15\)00370-5/fulltext](https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(15)00370-5/fulltext)
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27107280/>
- <https://link.springer.com/article/10.1007/s00038-019-01219-y>
- <https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.162.5.1022>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9822839/#:~:text=According%20to%20weighted%20average%20analysis,between%20latitude%20and%20suicide%20prevalence.>

BIBLIOGRAFIE/ Webografie

- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8939476/>
- <https://www.scielo.br/j/trends/a/XsqW4YkpVFnnNbCD3cNJg5Rv/>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666560322000445>
- <https://theworld.org/stories/2009-11-21/why-are-chileans-so-unhappy>
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18078584/>
- <https://www.elsevier.es/en-revista-revista-colombiana-psiquiatria-english-edition--479-articulo-suicide-behaviour-in-colombia-S2530312018300286>
- <https://bmcpsy psychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-017-1502-0>
- <https://english.elpais.com/international/2023-07-27/the-paradox-of-uruguay-suicide-record-in-the-happiest-country-in-south-america.html>
- <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>
- <https://afsp.org/suicide-statistics/>
- <https://afsp.org/risk-factors-protective-factors-and-warning-signs/>
- <https://academic.oup.com/book/29863/chapter-abstract/253073164?redirectedFrom=fulltext&login=false>
- <https://academic.oup.com/book/29863/chapter-abstract/253073164?redirectedFrom=fulltext&login=false>
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20482953/>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6351183/>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3662085/>
- <https://phhp.ufl.edu/2022/09/06/uf-study-explores-suicide-risk-for-people-with-disabilities/>

BIBLIOGRAFIE/ Webografie

- <https://sanatate-mintala.md/ziua-mondiala-de-prevenire-a-suicidului/#:~:text=Alte%20grupuri%20de%20risc%20cuprind,popoare%20indigene%2C%20precum%20%C8%99i%20de%C8%9Binu%C8%9Bi.>
- <https://www.samaritans.org/about-samaritans/research-policy/prisons-and-suicide/>
- <https://pdf.sciencedirectassets.com>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_in_Japan
- <https://www.nippon.com/en/features/h00158/>
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8829436/>
- <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002580249003000311?icid=int.sj-abstract.similar-articles.2>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC161715/>
- <https://countryeconomy.com/demography/mortality/causes-death/suicide/israel?year=2015>
- <https://link.springer.com/article/10.1007/s00038-019-01219-y>
- https://kostat.go.kr/boardDownload.es?bid=12045&list_no=386982&seq=1
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6599115/>
- <https://www.abs.gov.au/statistics/health/causes-death/causes-death-australia/latest-release>
- <https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/3309.0Main+Features11994%20to%202004?OpenDocument>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_in_Australia

A vibrant red ink splatter or brushstroke serves as a background for the central text. The splatter is irregular and textured, with some areas appearing more saturated than others, giving it a dynamic and artistic feel.

**VĂ MULȚUMIM
PENTRU ATENȚIE!**

autori: Angheluta Alexandra, Cîrlig Adelina, Cutitotiu Florentina, Dragoș Emira, Duralia Roxana
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara